

Curam BSS ^[1]

Curam® Sandoz. Tabletas recubiertas y polvo para suspensión oral. Cada tableta recubierta de 625 mg contiene 500 mg de amoxicilina en forma de amoxicilina trihidrato y 125 mg de ácido clavulánico en forma de clavulanato de potasio. Cada tableta recubierta de 1000 mg contiene 875 mg de amoxicilina en forma de amoxicilina trihidrato y 125 mg de ácido clavulánico en forma de clavulanato de potasio. 5 ml de suspensión reconstituido de **Curam®312,5mg/5mL** contiene amoxicilina trihidrato correspondiente a 250 mg amoxicilina, clavulanato de potasio correspondiente a 62,5 mg de ácido clavulánico. 5 ml de suspensión reconstituido de **Curam® 457mg/5mL** contiene amoxicilina trihidrato correspondiente a 400 mg amoxicilina, clavulanato de potasio correspondiente a 57 mg de ácido clavulánico.

Curam® está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y niños: sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente diagnosticada), otitis media aguda, exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica (adecuadamente diagnosticada), neumonía adquirida en la comunidad, cistitis, pielonefritis, infecciones de la piel y tejidos blandos en particular celulitis, mordeduras de animales, absceso dental severo con celulitis diseminada, infecciones óseas y articulares, en particular osteomielitis. Se debe considerar la orientación oficial sobre el uso apropiado de agentes antibacterianos. Dosis. Adultos y niños con ≥ 40 kg: **Curam®625mg**, 1 tableta recubierta tres veces al día. **Curam®1000mg** 1 tableta recubierta dos veces al día. Niños < 40 kg: **Curam® 625 mg** tabletas recubiertas, **Curam® suspensión 312,5 mg / 5 ml**: 20 mg / 5 mg / kg / día a 60 mg / 15 mg / kg / día administrados en tres dosis divididas. No hay datos clínicos disponibles para las formulaciones de amoxicilina / ácido clavulánico en una proporción 4: 1 de más de 40 mg / 10 mg / kg por día en niños menores de 2 años. **Curam® suspensión 457/5mL**: 25 mg / 3,6 mg / kg / día a 45 mg / 6,4 mg / kg / día administrados en dos dosis divididas; se puede considerar hasta 70 mg / 10 mg / kg / día como dos dosis divididas para algunas infecciones (como otitis media, sinusitis e infecciones del tracto respiratorio inferior). Contraindicaciones. Hipersensibilidad a las sustancias activas, a cualquiera de las penicilinas o a cualquiera de los excipientes. Antecedentes de una reacción de hipersensibilidad inmediata grave (p. ej., anafilaxia) a otro agente betalactámico (p. ej., cefalosporina, carbapenem o monobactámico). Antecedentes de ictericia/deficiencia hepática debido a amoxicilina/ácido clavulánico. Advertencias. Convulsiones, Deficiencia hepática, Disfunción renal debe ajustar dosis. Efectos Adversos. Candidiasis mucocutánea. Diarrea, náuseas, vómitos. **CDS 2017**. Registro Sanitario Nicaragua: **Curam 312.5mg/5mL** polvo para suspensión oral N°01135211214, **Curam 457mg/5mL** polvo para suspensión oral N° 0197771007, **Curam 1000mg** tabletas recubiertas N°01126410513.

Source URL: <https://www.cac.sandoz.com/es/curam-bss>

Links

[1] <https://www.cac.sandoz.com/es/curam-bss>