

Candesartán BSS ^[1]

Candesartán cilexetilo Sandoz en presentación de tabletas de 8 mg, 16 mg y 32 mg. Excipientes con efecto conocido: lactosa monohidratada. **Indicaciones:** Hipertensión esencial en adultos. Tratamiento de hipertensión en niños y adolescentes entre 6 a ?18 años de edad. Tratamiento de pacientes adultos con insuficiencia cardíaca y alteración de la función sistólica ventricular izquierda (fracción de eyección ventricular izquierda ? 40%), cuando los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) no son tolerados o como terapia adjunta a IECAs en pacientes con falla cardíaca sintomática, a pesar de terapia óptima, o cuando no son tolerados los antagonistas del receptor mineralocorticoide.

Posología: *Hipertensión:* la dosis inicial recomendada y la dosis habitual de mantenimiento es de 8 mg una vez al día. La dosis puede aumentarse hasta 16 mg una vez al día. Si la presión arterial no está lo suficientemente controlada después de 4 semanas de tratamiento con 16 mg una vez al día y hasta un máximo de 32 mg una vez al día. El tratamiento debe ajustarse según la respuesta de la presión arterial. **Candesartán cilexetilo Sandoz** también se puede administrar con otros agentes antihipertensivos. La adición de hidroclorotiazida ha demostrado tener un efecto antihipertensivo aditivo con diversas dosis.

Candesartán cilexetilo Sandoz. *Uso en adultos mayores:* no es necesario el ajustar la dosis inicial en estos pacientes. *Uso en pacientes con reducción del volumen intravascular:* una dosis inicial de 4 mg puede ser considerada en pacientes con riesgo de hipotensión, tales como pacientes con posible depleción de volumen. *Uso en pacientes con insuficiencia renal:* la dosis inicial es de 4 mg en pacientes con insuficiencia renal, incluyendo pacientes en hemodiálisis. La dosis debe ajustarse según la respuesta. Existe una experiencia limitada en pacientes con insuficiencia renal muy grave o en fase terminal ($Cl_{\text{creatinina}} \leq 15 \text{ ml / min}$). *Uso en insuficiencia hepática:* se recomienda una dosis inicial de 4 mg una vez al día en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada. La dosis puede ajustarse según la respuesta. **Candesartán cilexetilo Sandoz** está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave y / o colestasis. *Uso en pacientes de raza negra:* el efecto antihipertensivo del **Candesartán cilexetilo Sandoz** ® es menos pronunciado en los pacientes de raza negra que en pacientes de otras razas, en consecuencia, puede ser necesario con mayor frecuencia el ajuste en la dosis de ® y el uso terapia concomitante para el control de la presión arterial en pacientes de raza negra que en **Candesartán cilexetilo Sandoz** pacientes de otras razas. *Uso en población pediátrica:* niños y adolescentes entre 6 a ?18 años de edad, la dosis de inicio recomendada es 4 mg una vez al día. Para pacientes pesando ?50 kg en quienes la presión sanguínea no está adecuadamente controlada, la dosis puede ser aumentada a un máximo de 8 mg una vez al día. Para pacientes pesando ?50 kg: en quienes la presión sanguínea no está adecuadamente controlada, la dosis puede ser aumentada a 8 mg una vez al día y luego si se requiere aumentar a 16 mg una vez al día. Las dosis sobre 32 mg no han sido estudiadas en pacientes pediátricos. **Candesartán cilexetilo Sandoz** no ha sido estudiado en niños con tasa de filtración glomerular menor a 30 mL/min/1.73m². *Pacientes pediátricos de raza negra:* el efecto antihipertensivo de **Candesartán cilexetilo Sandoz** es menos pronunciado en pacientes de raza negra que en pacientes que no sean de raza negra. Niños entre 1 año a ?6 años de edad: no se ha establecido la seguridad y eficacia en niños entre 1 y ?6 años de edad. **Candesartán cilexetilo Sandoz** está contraindicado en niños con edades menor a 1 año. *Dosificación en la insuficiencia cardíaca:* la dosis inicial recomendada habitual del **Candesartán cilexetilo Sandoz** es de 4 mg una vez al día. El ajuste hasta la dosis deseada de 32 mg una vez al día (dosis máxima) o hasta la dosis máxima tolerada se realiza mediante la duplicación de la dosis en intervalos de al menos 2 semanas. **Candesartán cilexetilo Sandoz** puede administrarse con otro tratamiento para la insuficiencia cardíaca, incluyendo IECA, beta bloqueadores, diuréticos y digitalis o una combinación de estos medicamentos. **Candesartán cilexetilo Sandoz** puede ser administrado en conjunto con un IECA en pacientes con falla cardíaca sintomática a pesar de la terapia estándar óptima para falla cardíaca cuando no es tolerado un antagonista del receptor mineralocorticoide. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al **Candesartán cilexetilo Sandoz** sustancia activa o a cualquiera de los excipientes. Embarazo. Insuficiencia hepática severa y/o colestasis. El uso concomitante de

Source URL: <https://www.cac.sandoz.com/es/candesartan-bss-0>

Links

[1] <https://www.cac.sandoz.com/es/candesartan-bss-0>